

УДК 512.554

$(-1, 1)$ -СУПЕРАЛГЕБРЫ ВЕКТОРНОГО ТИПА. ЙОРДАНОВЫ СУПЕРАЛГЕБРЫ ВЕКТОРНОГО ТИПА И ИХ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБЕРТЫВАЮЩИЕ

В. Н. Желябин

Аннотация. Устанавливается связь между областями целостности, проективными конечнопорожденными модулями над ними, дифференцированиями области целостности и $(-1, 1)$ -супералгебрами векторного типа. Изучаются свойства универсальных ассоциативных обертывающих простых йордановых супералгебр векторного типа.

DOI 10.17377/smzh.2015.56.305

Ключевые слова: йорданова супералгебра, $(-1, 1)$ -супералгебра, скрученная супералгебра векторного типа, дифференциально простая алгебра, проективный модуль, универсальные обертывающие.

75-летию Ю. Л. Ершова посвящается

Примеры бесконечномерных простых йордановых супералгебр можно получить, используя процесс удвоения Кантора, из ассоциативной суперкоммутативной супералгебры, на которой задана йорданова скобка (см. [1–3]). Если йорданова скобка задана на ассоциативно-коммутативной алгебре, то четная часть полученной йордановой супералгебры ассоциативна, а нечетная часть является однопорожденным модулем над четной частью. Аналогичным образом получают простые $(-1, 1)$ -супералгебры из дифференциально простых относительно одного дифференцирования, ассоциативных коммутативных алгебр. В [4] описаны простые $(-1, 1)$ -супералгебры характеристики $\neq 2, 3$. Оказалось, что четная часть A такой супералгебры является ассоциативно-коммутативной алгеброй, а нечетная часть M — конечнопорожденным ассоциативным и коммутативным A -модулем. Умножение в M задается с помощью фиксированных конечных множеств дифференцирований и элементов алгебры A . При некоторых ограничениях на алгебру A нечетная часть M является однопорожденным A -модулем, а исходная $(-1, 1)$ -супералгебра — скрученной супералгеброй векторного типа относительно одного дифференцирования. Полученные в [4] $(-1, 1)$ -супералгебры будем также называть $(-1, 1)$ -супералгебрами векторного типа. Следует отметить, что присоединенная йорданова супералгебра для простой $(-1, 1)$ -супералгебры является унитарной простой специальной супералгеброй с ассоциативной четной частью.

В [5, 6] описаны унитарные простые специальные йордановы супералгебры с ассоциативной четной частью A , нечетная часть M которых является ассоциативным A -модулем. В этом случае если супералгебра не является супералгеброй

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 14-21-00065).

невырожденной билинейной суперформы, то ее четная часть A — дифференциально простая алгебра, а нечетная часть M — конечнопорожденный проективный A -модуль ранга 1. Здесь так же, как и для $(-1, 1)$ -супералгебр, умножение в M задается с помощью фиксированных конечных множеств дифференцирований и элементов алгебры A . И. П. Шестаковым в [6] построен новый пример унитарной простой йордановой супералгебры векторного типа над полем действительных чисел, у которой нечетная часть не является однопорожденным модулем. Примеры новых унитарных простых йордановых супералгебр векторного типа над другими полями построены в [7, 8]. Данные примеры отвечают на вопрос Кантарини — Каца из [9]. Отметим, что в построенных примерах простых йордановых супералгебр нечетная часть является двупорожденным модулем над четной частью. В [10] приведены первичные йордановы супералгебры векторного типа над полем действительных чисел, у которых нечетная часть как модуль порождается более чем двумя элементами. В [11] найдены необходимые и достаточные условия в терминах алгебры Ли дифференцирований области целостности, позволяющие строить йордановы супералгебры векторного типа, четная часть которых является исходной областью целостности.

В данной работе изучаются аналогичные вопросы для $(-1, 1)$ -супералгебр. В частности, приводятся новые примеры простых и первичных $(-1, 1)$ -супералгебр векторного типа, у которых нечетная часть порождается как модуль двумя элементами в случае простых супералгебр и произвольным числом элементов в случае первичных супералгебр. Также описаны некоторые свойства универсальных обертывающих простых йордановых супералгебр векторного типа. В частности доказано, что четная часть универсальной обертывающей содержит два центральных ортогональных идемпотента, сумма которых равна единице.

§ 1. Йордановы и $(-1, 1)$ -супералгебры

Пусть $\mathbb{F}$ — поле характеристики, не равной 2. Тогда $\mathbb{Z}_2$ -градуированной алгеброй или супералгеброй будем называть алгебру $A = A_0 \oplus A_1$, где компоненты A_0, A_1 умножаются по правилу

$$A_i A_j \subseteq A_{i+j \pmod{2}}.$$

Векторное подпространство A_0 — четная часть супералгебры A , A_1 — нечетная. Определим для однородных элементов $x \in A_0 \cup A_1$ функцию четности, полагая

$$|x| = i \quad \text{при } x \in A_i.$$

Пусть G — алгебра Грассмана над $\mathbb{F}$, т. е. ассоциативная алгебра, заданная образующими $1, e_1, e_2, \dots$ и определяющими соотношениями

$$e_i e_j = -e_j e_i.$$

Произведения $1, e_{i_1} \dots e_{i_k}$, где $i_1 < i_2 < \dots < i_k$, образуют базис алгебры G . Пусть G_0, G_1 — подпространства, порожденные соответственно произведениями четной и нечетной длины. Тогда $G = G_0 + G_1$ — супералгебра. Пусть $A = A_0 + A_1$ — произвольная супералгебра. Рассмотрим тензорное произведение $G \otimes A$ над полем $\mathbb{F}$. Тогда $G(A) = G_0 \otimes A_0 + G_1 \otimes A_1$ является подалгеброй в алгебре $G \otimes A$ и называется *грассмановой оболочкой* супералгебры A . Супералгебра A называется *йордановой супералгеброй* тогда и только тогда, когда ее

грассманова оболочка $G(A)$ — йорданова алгебра, т. е. в $G(A)$ выполняются тождества

$$xy = yx, \quad (x^2y)x = x^2(yx).$$

Супералгебра A называется $(-1, 1)$ -супералгеброй, если ее грассманова оболочка является $(-1, 1)$ -алгеброй, т. е. выполняются тождества

$$(x, y, y) = 0, \quad (x, y, z) + (y, z, x) + (z, x, y) = 0,$$

где $(x, y, z) = (xy)z - x(yz)$ — ассоциатор элементов x, y, z .

После линеаризации тождеств получим, что в A для однородных элементов должны быть выполнены тождества

$$(x, y, z) + (-1)^{|y||z|}(x, z, y) = 0; \quad (1)$$

$$(x, y, z) + (-1)^{|x||y|+|x||z|}(y, z, x) + (-1)^{|x||z|+|y||z|}(z, x, y) = 0. \quad (2)$$

ПРИМЕР 1. Пусть Γ — коммутативная ассоциативная супералгебра над $\mathbb{F}$, D — ненулевое четное дифференцирование Γ , т. е. $D(\Gamma_i) \subseteq \Gamma_i$ и $\gamma \in \Gamma_0$. Через $\Gamma\xi$ обозначим изоморфную копию пространства Γ . На прямой сумме векторных пространств $B(\Gamma, D, \gamma) = \Gamma + \Gamma\xi$ определим умножение, полагая

$$a \cdot b = ab, \quad a \cdot b\xi = (ab)\xi, \quad a\xi \cdot b = (-1)^{|b|}ab\xi,$$

$$a\xi \cdot b\xi = (-1)^{|b|}(\gamma ab + 2D(a)b + aD(b)),$$

где $a, b \in \Gamma_0 \cup \Gamma_1$ и ab — произведение в алгебре Γ . Определим на $B(\Gamma, D, \gamma)$ $\mathbb{Z}_2$ -градуировку, полагая

$$B(\Gamma, D, \gamma)_0 = \Gamma_0 + \Gamma_1\xi, \quad B(\Gamma, D, \gamma)_1 = \Gamma_1 + \Gamma_0\xi.$$

Тогда $B(\Gamma, D, \gamma)$ является $(-1, 1)$ -супералгеброй и называется *скрученной супералгеброй векторного типа* [4].

Пусть $B = B_0 + B_1$ — $(-1, 1)$ -супералгебра. Тогда векторное пространство B с новым умножением для однородных элементов

$$a \odot_s b = \frac{1}{2}(ab + (-1)^{|a||b|}ba)$$

будет йордановой супералгеброй, которую обозначим через $B^{(+)}_s$.

Одним из способов получения йордановых алгебр является конструкция Кантора [1]. Пусть $(\Gamma, \cdot)$ — произвольная ассоциативная коммутативная супералгебра с билинейной суперкососимметрической операцией $\{, \}$, которую будем называть *скобкой*. Построим по $(\Gamma, \cdot)$ новую супералгебру, которую будем называть *дублем Кантора*. Пусть $J(\Gamma) = \Gamma + \Gamma\xi$, где $\Gamma\xi$ — изоморфная копия Γ . Введем на $J(\Gamma)$ умножение $\bullet$ следующим образом:

$$a \bullet b = ab, \quad a \bullet b\xi = (ab)\xi, \quad a\xi \bullet b = (-1)^{|b|}(ab)\xi, \quad a\xi \bullet b\xi = (-1)^{|b|}\{a, b\},$$

где $a, b \in \Gamma_0 \cup \Gamma_1$, а ab — произведение элементов a и b в алгебре Γ . Полученную супералгебру обозначим через $J(\Gamma, \{, \})$. Скобка $\{, \}$ называется *йордановой*, если $J(\Gamma, \{, \})$ является йордановой супералгеброй. Четная часть супералгебры $J(\Gamma, \{, \})$ — пространство $\Gamma_0 + \Gamma_1\xi$, нечетная — $\Gamma_1 + \Gamma_0\xi$.

ПРИМЕР 2. Пусть $(\Gamma, \cdot)$ — ассоциативная коммутативная супералгебра с ненулевым четным дифференцированием ∂ . Определим скобку следующим образом:

$$\{a, b\} = \partial(a)b - a\partial(b).$$

Тогда $J(\Gamma, \{, \})$ — йорданова супералгебра (см. [2, 12]), которая называется *йордановой супералгеброй векторного типа* и обозначается через $J(\Gamma, \partial)$. В этом случае скобка $\{, \}$ называется *йордановой скобкой векторного типа*. Заметим (см. [2, 12]), что $B(\Gamma, D, \gamma)^{(+s)}$ будет йордановой супералгеброй векторного типа $J(\Gamma, \frac{1}{2}D)$. Действительно, пусть $a+b\xi, c+d\xi \in \Gamma_0 + \Gamma_1\xi$, $a_1+b_1\xi, c_1+d_1\xi \in \Gamma_1 + \Gamma_0\xi$. Тогда

$$(a + b\xi + a_1 + b_1\xi) \odot_s (c + d\xi + c_1 + d_1\xi) = (a + b\xi) \odot_s (c + d\xi) + (a + b\xi) \odot_s (c_1 + d_1\xi) + (a_1 + b_1\xi) \odot_s (c + d\xi) + (a_1 + b_1\xi) \odot_s (c_1 + d_1\xi).$$

Теперь получаем

$$\begin{aligned} (a + b\xi) \odot_s (c + d\xi) &= \frac{1}{2}((a + b\xi) \cdot (c + d\xi) + (c + d\xi) \cdot (a + b\xi)) \\ &= ac + (ad)\xi + (bc)\xi - \frac{1}{2}(\gamma bd + 2D(b)d + bD(d)) - \frac{1}{2}(\gamma db + 2D(d)b + dD(b)) \\ &= ac + (ad)\xi + (bc)\xi - \frac{1}{2}(D(b)d - bD(d)) = (a + b\xi) \bullet (c + d\xi), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1\xi) \odot_s (c_1 + d_1\xi) &= \frac{1}{2}((a_1 + b_1\xi) \cdot (c_1 + d_1\xi) - (c_1 + d_1\xi) \cdot (a_1 + b_1\xi)) \\ &= a_1c_1 + (a_1d_1)\xi - (b_1c_1)\xi + \frac{1}{2}(D(b_1)d_1 - b_1D(d_1)) = (a_1 + b_1\xi) \bullet (c_1 + d_1\xi). \end{aligned}$$

Аналогично

$$(a + b\xi) \odot_s (c_1 + d_1\xi) = (a + b\xi) \bullet (c_1 + d_1\xi), \quad (a_1 + b_1\xi) \odot_s (c + d\xi) = (a_1 + b_1\xi) \bullet (c + d\xi).$$

Поэтому $B(\Gamma, D, \gamma)^{(+s)} = J(\Gamma, \frac{1}{2}D)$.

Напомним определение специальности йордановой супералгебры. Пусть $B = B_0 + B_1$ — ассоциативная супералгебра с операцией умножения $*$. Так же, как и в случае $(-1, 1)$ -супералгебр, определим на пространстве B суперсимметрическое произведение

$$a \odot_s b = \frac{1}{2}(a * b + (-1)^{|a||b|}b * a), \quad a, b \in B_0 \cup B_1.$$

Тогда получим йорданову супералгебру $B^{(+s)}$.

Йорданова супералгебра $J = J_0 + J_1$ называется *специальной*, если она вложима (как $\mathbb{Z}_2$ -градуированная алгебра) в супералгебру $B^{(+s)}$ для подходящей ассоциативной $\mathbb{Z}_2$ -градуированной алгебры B .

Тождество (1) означает, что любая $(-1, 1)$ -супералгебра правоальтернативная. Хорошо известно (см., например, [12]), что для любой правоальтернативной супералгебры B супералгебра $B^{(+s)}$ является специальной йордановой супералгеброй.

Действительно, можно считать, что B — унитарная алгебра. Рассмотрим ассоциативную супералгебру

$$\text{End } B = \text{End}_0 B + \text{End}_1 B, \quad \text{где } \text{End}_i B = \{\phi \in \text{End } B \mid \phi(B_j) \subseteq B_{j+i}, j = 1, 0\}.$$

Если $a \in B_i$, то оператор правого умножения R_a на элемент a принадлежит $\text{End}_i B$. Тогда отображение $R : B^{(+s)} \rightarrow (\text{End } B)^{(+s)}$, сопоставляющее $a \mapsto R_a$, является вложением супералгебр.

Отсюда следует специальность йордановой супералгебры $J(\Gamma, \partial)$. В [2, 13] приведено другое доказательство этого утверждения.

Описание простых $(-1, 1)$ -супералгебр дает

Теорема [4]. Пусть $B = A + M$ — простая $(-1, 1)$ -супералгебра над полем характеристики не 2, 3, с четной частью A и нечетной частью M . Тогда A — ассоциативная коммутативная алгебра, M — ассоциативный коммутативный A -модуль. Кроме того, существуют такие элементы $x_1, \dots, x_n \in M$, что $M = Ax_1 + \dots + Ax_n$, и произведение в M задается равенством

$$ax_i \cdot bx_j = \gamma_{ij}ab + 2D_{ij}(a)b + aD_{ji}(b), \quad i, j = 1, \dots, n, \quad (3)$$

где $\gamma_{ij} \in A$ и дифференцирования D_{ij} алгебры A удовлетворяют условиям

$$\gamma_{ij}x_k - \gamma_{ik}x_j = (\gamma_{jk} - \gamma_{kj})x_i, \quad (4)$$

$$D_{ij} = D_{ji}, D_{ij}(a)x_k = D_{ik}(a)x_j \quad (5)$$

для любых $i, j, k = 1, \dots, n$, $a \in A$. Алгебра A дифференциально простая относительно множества дифференцирований $\Delta = \{D_{ij} \mid i, j = 1, \dots, n\}$ и потому унитарна. Модуль M является проективным A -модулем ранга 1.

Отметим некоторые свойства четной и нечетной частей супералгебры B , удовлетворяющей условию теоремы, которая не изоморфна алгебре $B(\Gamma, D, \gamma)$, где Γ — ассоциативная коммутативная алгебра. В этом случае характеристика поля равна 0. Модуль M не имеет A -кручений. Как показано в [4], для $x, y \in M$ отображение $D_{x,y} : A \rightarrow A$, заданное правилом $D_{x,y}(a) = \frac{1}{2}(a, x, y)$, является дифференцированием. Поскольку B — правоальтернативная супералгебра, $D_{x,y} = D_{y,x}$. Справедливы равенства

$$bD_{x,y}(a) = D_{bx,y}(a) = D_{x,by}(a), \quad D_{x,y}(a)D_{u,v}(a) = D_{u,y}(a)D_{x,v}(a)$$

для любых $a, b \in A$ и $x, y \in M$. Более того, $D_{ij} = D_{x_i, x_j}$ для $i, j = 1, \dots, n$. Из $D_{ij}(a)x_k = D_{ik}(a)x_j$ получаем, что $D_{ij}(a)x_k \cdot x_l = D_{ik}(a)x_j \cdot x_l$ и $x_l \cdot D_{ij}(a)x_k = x_l \cdot D_{ik}(a)x_j$ для любого $a \in A$. Тогда в силу (3) $\gamma_{ij} = x_i \cdot x_j$ и

$$\gamma_{kl}D_{ij} + 2D_{kl}D_{ij} = \gamma_{jl}D_{ik} + 2D_{jl}D_{ik},$$

$$\gamma_{lk}D_{ij} + D_{lk}D_{ij} = \gamma_{lj}D_{ik} + D_{lj}D_{ik}, \quad i, j, k, l = 1, \dots, n.$$

Пусть $M^* = \text{Hom}_A(M, A)$. Для элемента a определим $\bar{a} \in (M \otimes_A M)^*$, полагая $\bar{a}(x \otimes y) = D_{x,y}(a)$. Аналогично [11] линейное отображение $\bar{\cdot} : A \rightarrow (M \otimes_A M)^*$, заданное правилом $\bar{\cdot} : a \mapsto \bar{a}$, является дифференцированием алгебры A в A -модуль $(M \otimes_A M)^*$.

В дальнейшем все кольца рассматриваются как алгебры над полем характеристики нуль.

Пусть теперь A — ассоциативное коммутативное кольцо с единицей без делителей нуля (область целостности) и M — конечнопорожденный проективный A -модуль ранга $rk(M) = 1$. Пусть $\bar{\cdot} : A \rightarrow (M \otimes_A M)^*$ — ненулевое линейное отображение. Предположим, что

$$\overline{ab} = \bar{a}\bar{b} + \bar{b}\bar{a}$$

для любых $a, b \in A$. По определению отображения $\bar{\cdot}$ получаем, что каждая пара элементов $x, y \in M$ задает дифференцирование $D_{x,y} : A \rightarrow A$ по правилу $D_{x,y}(a) = \bar{a}(x \otimes y)$. Тогда (см. [11])

$$D_{x,y} = D_{y,x}, \quad D_{ax,y} = aD_{x,y}, \quad D_{x,y}(a)z = D_{z,y}(a)x \quad (6)$$

для $a \in A$ и $x, y, z \in M$.

Пусть $x_1, \dots, x_n$ — порождающие A -модуля M , т. е. $M = Ax_1 + \dots + Ax_n$. Положим $D_{ij} = D_{x_i, x_j}$, $i, j = 1, \dots, n$. Тогда $D_{ij} = D_{ji}$.

Предложение 1. Для любого $a \in A$ имеют место равенства

$$D_{ij}(a)D_{kl} = D_{kl}(a)D_{ij}, \quad D_{ij}(a)D_{kl} = D_{kj}(a)D_{il}.$$

Доказательство аналогично доказательству предложения 3 из [11].

Зафиксируем в кольце A элементы γ_{ij} , где $i, j = 1, \dots, n$.

Предложение 2. Предположим, что для любых $i, j, k, l = 1, \dots, n$ выполняются равенства

$$\gamma_{lk}D_{ij} + D_{lk}D_{ij} = \gamma_{lj}D_{ik} + D_{lj}D_{ik}, \quad (7)$$

$$\gamma_{kl}D_{ij} + 2D_{kl}D_{ij} = \gamma_{jl}D_{ik} + 2D_{jl}D_{ik}. \quad (8)$$

Тогда имеет место (4), т. е. для любых $i, j, k = 1, \dots, n$

$$\gamma_{ij}x_k - \gamma_{ik}x_j = (\gamma_{jk} - \gamma_{kj})x_i.$$

Доказательство. Из (7) и (8) получаем

$$(\gamma_{kl} - 2\gamma_{lk})D_{ij} = (\gamma_{jl} - 2\gamma_{lj})D_{ik}.$$

Поэтому

$$D_{(\gamma_{kl}-2\gamma_{lk})x_j, x_i}(a) = D_{(\gamma_{jl}-2\gamma_{lj})x_k, x_i}(a)$$

для любого $a \in A$. Следовательно,

$$\bar{a}((\gamma_{kl} - 2\gamma_{lk})x_j \otimes x_i) = \bar{a}((\gamma_{jl} - 2\gamma_{lj})x_k \otimes x_i).$$

Тогда в силу условий на кольцо A и модуль M (см. [11])

$$(\gamma_{kl} - 2\gamma_{lk})x_j = (\gamma_{jl} - 2\gamma_{lj})x_k.$$

Из (8) и (6) получаем

$$\begin{aligned} 2D_{kl}D_{ij} &= -\gamma_{kl}D_{ij} + \gamma_{jl}D_{ik} + 2D_{jl}D_{ik} = -\gamma_{kl}D_{ij} + \gamma_{jl}D_{ik} + 2D_{lj}D_{ki} \\ &= -\gamma_{kl}D_{ij} + \gamma_{jl}D_{ik} - \gamma_{lj}D_{ki} + \gamma_{ij}D_{kl} + 2D_{ij}D_{kl}. \end{aligned}$$

Тогда

$$2[D_{kl}, D_{ij}] = 2(D_{kl}D_{ij} - D_{ij}D_{kl}) = -\gamma_{kl}D_{ij} + (\gamma_{jl} - \gamma_{lj})D_{ki} + \gamma_{ij}D_{kl}$$

для любых $i, j, k, l = 1, \dots, n$. Следовательно,

$$2[D_{lk}, D_{ij}] = -\gamma_{lk}D_{ij} + (\gamma_{jk} - \gamma_{kj})D_{li} + \gamma_{ij}D_{lk}.$$

Отсюда

$$2[D_{kl}, D_{ij}] - 2[D_{lk}, D_{ij}] = (\gamma_{lk} - \gamma_{kl})D_{ij} + (\gamma_{jl} - \gamma_{lj})D_{ki} + (\gamma_{kj} - \gamma_{jk})D_{li} = 0.$$

Аналогично предыдущему

$$(\gamma_{lk} - \gamma_{kl})x_j + (\gamma_{jl} - \gamma_{lj})x_k + (\gamma_{kj} - \gamma_{jk})x_l = 0.$$

Ввиду доказанного выше получаем

$$-\gamma_{lk}x_j + \gamma_{lj}x_k + (\gamma_{kj} - \gamma_{jk})x_l = 0.$$

Следовательно,

$$\gamma_{lj}x_k - \gamma_{lk}x_j = (\gamma_{jk} - \gamma_{kj})x_l.$$

Предложение 3. Предположим, что для любых $i, j, k, l = 1, \dots, n$ выполняются равенства

$$\gamma_{lk}D_{ij} + D_{lk}D_{ij} = \gamma_{lj}D_{ik} + D_{lj}D_{ik}, \quad \gamma_{ij}x_k - \gamma_{ik}x_j = (\gamma_{jk} - \gamma_{kj})x_i.$$

Тогда имеет место (8), т. е. для любых $i, j, k = 1, \dots, n$

$$\gamma_{kl}D_{ij} + 2D_{kl}D_{ij} = \gamma_{jl}D_{ik} + 2D_{jl}D_{ik}.$$

Доказательство. В силу (6), (7) получаем

$$\gamma_{lk}D_{ij} + D_{lk}D_{ij} = \gamma_{lj}D_{ik} + D_{lj}D_{ik}, \quad \gamma_{ji}D_{kl} + D_{ji}D_{kl} = \gamma_{jl}D_{ik} + D_{jl}D_{ik}.$$

Поэтому ввиду (6)

$$[D_{ij}, D_{kl}] = \gamma_{lk}D_{ij} - \gamma_{ji}D_{kl} + (\gamma_{jl} - \gamma_{lj})D_{ik}.$$

Тогда при $j = l$

$$[D_{ij}, D_{kj}] = \gamma_{jk}D_{ij} - \gamma_{ji}D_{kj}.$$

По условию предложения

$$[D_{ij}, D_{kj}] = D_{\gamma_{jk}x_i, x_j} + D_{-\gamma_{ji}x_k, x_j} = D_{\gamma_{jk}x_i - \gamma_{ji}x_k, x_j} = -(\gamma_{ik} - \gamma_{ki})D_{jj}.$$

В силу предложения 5 из [11]

$$(\gamma_{ij} - \gamma_{ji})D_{lk} + D_{ij}D_{lk} = (\gamma_{lj} - \gamma_{jl})D_{ik} + D_{lj}D_{ik}.$$

Так как $\gamma_{ji}D_{kl} + D_{ji}D_{kl} = \gamma_{jl}D_{ik} + D_{jl}D_{ik}$, складывая два последних равенства и поменяв индексы i с k , j с l , получим

$$\gamma_{kl}D_{ij} + 2D_{kl}D_{ij} = \gamma_{jl}D_{ik} + 2D_{jl}D_{ik}.$$

Аналогично доказывается

Предложение 4. Предположим, что для любых $i, j, k, l = 1, \dots, n$ выполняются равенства

$$\gamma_{kl}D_{ij} + 2D_{kl}D_{ij} = \gamma_{jl}D_{ik} + 2D_{jl}D_{ik}, \quad \gamma_{ij}x_k - \gamma_{ik}x_j = (\gamma_{jk} - \gamma_{kj})x_i.$$

Тогда имеет место (7), т. е. для любых $i, j, k = 1, \dots, n$

$$\gamma_{lk}D_{ij} + D_{lk}D_{ij} = \gamma_{lj}D_{ik} + D_{lj}D_{ik}.$$

Предложение 5. Предположим, что для любых $i, j, k, l = 1, \dots, n$ выполняются равенства

$$[D_{ik}, D_{kj}] = -(\gamma_{ij} - \gamma_{ji})D_{kk}, \tag{9}$$

$$2[D_{ik}, D_{kj}] = \gamma_{jk}D_{ik} - \gamma_{ik}D_{kj}. \tag{10}$$

Тогда имеют место равенства (7), (8).

Доказательство. Сначала докажем, что имеет место (4), т. е.

$$\gamma_{ij}x_k - \gamma_{ik}x_j = (\gamma_{jk} - \gamma_{kj})x_i.$$

Для любого $a \in A$ из (9) и (10) получаем

$$-2(\gamma_{ij} - \gamma_{ji})D_{kk}(a) = \gamma_{jk}D_{ik}(a) - \gamma_{ik}D_{kj}(a).$$

Тогда

$$-2(\gamma_{ij} - \gamma_{ji})\bar{a}(x_k \otimes x_k) = \gamma_{jk}\bar{a}(x_i \otimes x_k) - \gamma_{ik}(x_j \otimes x_k).$$

Поэтому

$$-2(\gamma_{ij} - \gamma_{ji})x_k = \gamma_{jk}x_i - \gamma_{ik}x_j.$$

В силу (9) и следствия из [11] имеем

$$(\gamma_{ij} - \gamma_{ji})x_k = (\gamma_{ik} - \gamma_{ki})x_j + (\gamma_{kj} - \gamma_{jk})x_i.$$

Следовательно, $(\gamma_{ij} - \gamma_{ji})x_k = \gamma_{ki}x_j - \gamma_{kj}x_i$.

Пусть $G(l.k.i, j) = D_{lk}D_{ij} - D_{lj}D_{ik}$. Тогда для любого $a \in A$ ввиду предложения 1 получаем

$$\begin{aligned} D_{ii}(a)G(l.k.i, j) &= D_{ii}(a)(D_{lk}D_{ij} - D_{lj}D_{ik}) \\ &= D_{il}(a)(D_{ik}D_{ij} - D_{ij}D_{ik}) = -(\gamma_{kj} - \gamma_{jk})D_{il}(a)D_{ii} = -(\gamma_{kj} - \gamma_{jk})D_{ii}(a)D_{il}. \end{aligned}$$

Так как A — область целостности, по (4)

$$G(l.k.i, j) = -(\gamma_{kj} - \gamma_{jk})D_{il} = (\gamma_{jk} - \gamma_{kj})D_{il} = \gamma_{lj}D_{ik} - \gamma_{lk}D_{ij}.$$

Отсюда $\gamma_{lk}D_{ij} + D_{lk}D_{ij} = \gamma_{lj}D_{ik} + D_{lj}D_{ik}$. Аналогично доказывается, что имеет место (8).

Следствие. Равенства (7), (8) и (9), (10) эквивалентны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В силу предложения 5 достаточно доказать, что из (7) и (8) следует (9), (10).

Пусть имеют место (7) и (8). Тогда по предложению 2

$$\gamma_{ij}x_k - \gamma_{ik}x_j = (\gamma_{jk} - \gamma_{kj})x_i.$$

Как показано в предложении 3, справедливо

$$[D_{ij}, D_{kj}] = -(\gamma_{ik} - \gamma_{ki})D_{jj},$$

т. е. имеет место (9).

Ввиду предложения 2

$$2[D_{lk}, D_{ij}] = -\gamma_{lk}D_{ij} + (\gamma_{jk} - \gamma_{kj})D_{li} + \gamma_{ij}D_{lk}.$$

Полагая $j = k, l = j$, получаем

$$2[D_{ik}, D_{kj}] = \gamma_{jk}D_{ik} - \gamma_{ik}D_{kj},$$

т. е. имеет место (10).

Теорема 1. Пусть A — область целостности. Пусть $M = Ax_1 + \dots + Ax_n$ — конечнопорожденный проективный A -модуль ранга 1, отображение $- : A \mapsto (M \otimes_A M)^*$ — ненулевое дифференцирование алгебры A в A -модуль $(M \otimes_A M)^*$ и $\Delta = \{D_{ij} \mid i, j = 1, \dots, n\}$ — множество дифференцирований алгебры A , где $D_{ij}(a) = \bar{a}(x_i \otimes x_j)$. Зафиксируем в кольце A подмножество $\Upsilon = \{\gamma_{ij} \in A, i, j = 1, \dots, n\}$. Рассмотрим векторное пространство $B(A, \Delta, \Upsilon) = A \oplus M$ и зададим на нем структуру Z_2 -градуированной алгебры, полагая

$$a \cdot b = ab, \quad a \cdot (bx_i) = (bx_i) \cdot a = (ab)x_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

$$ax_i \cdot bx_j = \gamma_{ij}ab + 2D_{ij}(a)b + aD_{ij}(b), \quad i, j = 1, \dots, n,$$

где $a, b \in A$ и ab — произведение элементов a, b в A . Предположим, что дифференцирования D_{ij} и элементы из Υ удовлетворяют равенствам (9), (10). Тогда пространство $B(A, \Delta, \Upsilon)$ — $(-1, 1)$ -супералгебра с четной частью A и нечетной M .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Покажем, что умножение в $B(A, \Delta, \Upsilon)$ задано корректно. Действительно, пусть $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0$. Тогда

$$a_1D_{1k} + \dots + a_nD_{nk} = D_{a_1x_1 + \dots + a_nx_n, x_k} = 0$$

для любого фиксированного $k = 1, \dots, n$. В силу предложения 5 имеет место (7), т. е.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a_i D_{ik} \cdot b D_{kj} &= \sum_{i=1}^n a_i D_{ik}(b) D_{kj} + \sum_{i=1}^n a_i b D_{ik} \cdot D_{kj} \\ &= \sum_{i=1}^n a_i D_{ik}(b) D_{kj} - \sum_{i=1}^n a_i b \gamma_{ik} D_{kj} + \sum_{i=1}^n a_i b \gamma_{ij} D_{kk} + \sum_{i=1}^n a_i b D_{ij} \cdot D_{kk} \\ &= \sum_{i=1}^n a_i b \gamma_{ij} D_{kk} + \sum_{i=1}^n a_i D_{ij}(b) D_{kk} - \sum_{i=1}^n a_i b \gamma_{ik} D_{kj}. \end{aligned}$$

С другой стороны, по (8)

$$\begin{aligned} 2b D_{kj} \sum_{i=1}^n a_i D_{ik} &= \sum_{i=1}^n 2b D_{kj}(a_i) D_{ik} + \sum_{i=1}^n 2a_i b D_{kj} \cdot D_{ik} \\ &= \sum_{i=1}^n 2b D_{kj}(a_i) D_{ik} + \sum_{i=1}^n 2a_i b D_{jk} \cdot D_{ki} \\ &= \sum_{i=1}^n 2b D_{kj}(a_i) D_{ik} + \sum_{i=1}^n a_i b \gamma_{ik} D_{kj} + \sum_{i=1}^n 2a_i b D_{ik} \cdot D_{kj} - \sum_{i=1}^n a_i b \gamma_{jk} D_{ki} \\ &= \sum_{i=1}^n 2b D_{kj}(a_i) D_{ik} + \sum_{i=1}^n a_i b \gamma_{ik} D_{kj}. \end{aligned}$$

Следовательно, $\sum_{i=1}^n a_i b \gamma_{ik} D_{kj} = - \sum_{i=1}^n 2b D_{kj}(a_i) D_{ik} = - \sum_{i=1}^n 2b D_{ij}(a_i) D_{kk}$. Поэтому

$$\sum_{i=1}^n a_i D_{ik} \cdot b D_{kj} = \sum_{i=1}^n a_i b \gamma_{ij} D_{kk} + \sum_{i=1}^n a_i D_{ij}(b) D_{kk} + 2b D_{ij}(a_i) D_{kk} = 0.$$

Так как A — область целостности, имеем

$$\sum_{i=1}^n a_i b \gamma_{ij} + a_i D_{ij}(b) + 2b D_{ij}(a_i) = 0.$$

Отсюда

$$(a_1x_1 + \dots + a_nx_n) \cdot bx_j = 0.$$

Следовательно, умножение в $B(A, \Delta, \Upsilon)$ задано корректно.

Непосредственной проверкой получаем, что $B(A, \Delta, \Upsilon)$ — $(-1, 1)$ -супералгебра.

Рассмотрим йорданову супералгебру $B(A, \Delta, \Upsilon)^{(+)}_s$. Тогда умножение нечетных элементов $B(A, \Delta, \Upsilon)^{(+)}_s$ задается равенством

$$ax_i \cdot bx_j = \frac{(\gamma_{ij} - \gamma_{ji})}{2}ab + \frac{1}{2}D_{ij}(a)b - \frac{1}{2}aD_{ij}(b), \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Пусть $\gamma'_{ij} \in A$ такие, что $\gamma'_{ij} = -\gamma'_{ji}$, $[D_{ik}, D_{jk}] = -\gamma'_{ij}D_{kk}$ и $\Delta = \{D_{ij} \mid i, j = 1, \dots, n\}$. Тогда, как показано в [11], векторное пространство $J(A, \Delta) = A \oplus M$ с заданным на нем умножением

$$a \cdot b = ab, \quad a \cdot (bx_i) = (bx_i) \cdot a = (ab)x_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

$$ax_i \cdot bx_j = \gamma'_{ij}ab + D_{ij}(a)b - aD_{ij}(b), \quad i, j = 1, \dots, n,$$

где $a, b \in A$ и ab — произведение элементов a, b в A , является йордановой супералгеброй с четной частью A и нечетной M . Пусть $\alpha \in A$ и $D_{11}(\alpha) \neq 0$, Γ — алгебра частных относительно множества $\{D_{11}(\alpha), \dots, D_{11}(\alpha)^n, \dots\}$. Тогда $\Gamma = A[D_{11}(\alpha)^{-1}]$ — A -алгебра, порожденная $D_{11}(\alpha)^{-1}$. По теореме 2 из [11] $J(A, \Delta)$ — подсупералгебра в $J(\Gamma, D_{11})$, $D_{ij} = \alpha_i \alpha_j D_{11}$, $x_i = \alpha_i \xi$, $\gamma'_{ij} = \alpha_i D_{11}(\alpha_j) - \alpha_j D_{11}(\alpha_i) \in A$, где $\alpha_1 = D_{11}(\alpha)^{-1}D_{11}(\alpha), \dots, \alpha_n = D_{11}(\alpha)^{-1}D_{n1}(\alpha)$. Существует такой $\gamma \in \Gamma$, что $\gamma \alpha_i \alpha_j \in A$.

Рассмотрим $(-1, 1)$ -супералгебру $B(\Gamma, 2D_{11}, 2\gamma)$. Тогда для $a, b \in A$ в супералгебре $B(\Gamma, 2D_{11}, 2\gamma)$ получаем

$$ax_i \cdot bx_j = 2(\gamma \alpha_i \alpha_j + 2D_{11}(\alpha_i) \alpha_j + \alpha_i D_{11}(\alpha_j))ab + 4\alpha_i \alpha_j D_{11}(a)b + 2a\alpha_i \alpha_j D_{11}(b).$$

Поэтому $J(A, \Delta)$ — подсупералгебра в $B(\Gamma, 2D_{11}, 2\gamma)^{(+)}_s$.

§ 2. Примеры $(-1, 1)$ -супералгебр $B(A, \Delta, \Upsilon)$

Пусть R — поле действительных чисел и n — натуральное число. Рассмотрим алгебру полиномов $R[x_0, \dots, x_n]$ от переменных $x_0, x_1, \dots, x_n$ и многочлен

$$S^n(x_0, \dots, x_n) = x_0^2 + \dots + x_n^2 - 1.$$

Пусть

$$\Gamma_n = R[x_0, \dots, x_n] / (x_0^2 + \dots + x_n^2 - 1)$$

— фактор-алгебра алгебры $R[x_0, \dots, x_n]$ по идеалу

$$(x_0^2 + \dots + x_n^2 - 1) = S^n(x_0, \dots, x_n)R[x_0, \dots, x_n].$$

Отождествим образы элементов $x_0, x_1, \dots, x_n$ при каноническом гомоморфизме $R[x_0, \dots, x_n] \mapsto \Gamma_n$ с элементами $x_0, x_1, \dots, x_n$. Тогда

$$\Gamma_n = R[x_1, \dots, x_n] + x_0 R[x_1, \dots, x_n],$$

где $R[x_1, \dots, x_n]$ — кольцо полиномов от переменных $x_1, \dots, x_n$. Алгебра Γ_n не содержит делителей нуля.

Пусть A_n — подалгебра в Γ_n , порожденная элементами $1, x_1^2, \dots, x_n^2, x_i x_j$, $i, j = 0, \dots, n$, $i \neq j$. В алгебре Γ_n рассмотрим векторное подпространство $M_n = A_n x_0 + \dots + A_n x_n$. Тогда $\Gamma_n = A_n + M_n$ — Z_2 -градуированная алгебра. Как известно, M_n — проективный A_n -модуль ранга 1. В силу [14] A_n -модуль M_n не может быть порожден меньшим, чем $n + 1$, числом элементов.

Пусть D — четное дифференцирование алгебры Γ_n , т. е. $D(A_n) \subseteq A_n$, $D(M_n) \subseteq M_n$. Предположим, что D не равно нулю на A_n . Тогда $D_{ij} = x_i x_j D$

— ненулевые дифференцирования алгебры A_n , $i, j = 0, \dots, n$. Пусть $\gamma \in A$ и $\gamma_{ij} = 2(\gamma x_i x_j + 2D(x_i)x_j + D(x_j)x_i)$. Поскольку D — четное дифференцирование, то $\gamma_{ij} \in A_n$.

Теперь рассмотрим $(-1, 1)$ -супералгебру $B(\Gamma_n, 2D, 2\gamma)$. В этой супералгебре рассмотрим подпространство

$$B(A_n, \Delta_n, \Upsilon_n) = A_n + M_n \xi,$$

где $\Delta_n = \{2D_{ij} \mid i, j = 0, \dots, n\}$, $\Upsilon_n = \{\gamma_{ij} \mid i, j = 0, \dots, n\}$. Тогда для $a, b \in A_n$ в супералгебре $B(\Gamma_n, 2D, 2\gamma)$

$$\begin{aligned} (ax_i)\xi \cdot (bx_j)\xi &= 2\gamma(ax_i)(bx_j) + 4D(ax_i)bx_j + 2D(bx_j)ax_i \\ &= 2\gamma(ax_i)(bx_j) + 4D(x_i)abx_j + 4x_ix_jD(a)b + 2D(x_j)abx_i + 2x_ix_jD(b)a \\ &= \gamma_{ij}ab + 4D_{ij}(a)b + 2D_{ij}(b)a \in A. \end{aligned}$$

Поэтому $B(A_n, \Delta_n, \Upsilon_n)$ — подсупералгебра $(-1, 1)$ -супералгебры $B(\Gamma_n, 2D, 2\gamma)$.

Заметим, что йорданова супералгебра $B(A_n, \Delta_n, \Upsilon_n)^{(+)_s}$ совпадает с супералгеброй $J(A_n, \Delta'_n)$, где $\Delta'_n = \{D_{ij} \mid i, j = 0, \dots, n\}$, построенной в [10]. Поскольку $J(A_n, \Delta'_n)$ — первичная супералгебра (см. [10]), $B(A_n, \Delta_n, \Upsilon_n)$ — первичная $(-1, 1)$ -супералгебра. Супералгебра $B(A_n, \Delta_n, \Upsilon_n)$ неизоморфна супералгебре $B(A, \partial, \gamma)$.

Пусть $n = 1$ и $D = x_1 \frac{\partial}{\partial x_0} - x_0 \frac{\partial}{\partial x_1}$, где $\frac{\partial}{\partial x_i}$ — частная производная по переменной x_i . Как доказано в [7], супералгебра $J(A_1, \Delta'_1)$ простая. Поэтому $B(A_1, \Delta_1, \Upsilon_1)$ — простая $(-1, 1)$ -супералгебра.

Пусть F — поле характеристики 0. Рассмотрим координатное кольцо Λ алгебраического многообразия, заданного многочленом $f(x, y) = x^2 + y^4 - 1$, т. е. $\Lambda = F[x, y]/f(x, y)F[x, y]$ — фактор-алгебра по идеалу, порожденному полиномом $f(x, y)$. отождествим образы элементов x и y при каноническом гомоморфизме $F[x, y] \mapsto \Lambda$ с элементами x и y . Рассмотрим в Λ подалгебру A , порожденную элементами $1, y^2, xy$, и A -модуль $M = Ax + Ay$. Тогда $\Lambda = A + M$ — Z_2 -градуированная алгебра. Отображение $D = 2y^3 \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}$ — четное дифференцирование алгебры Λ . Как показано в [8], M — проективный A -модуль ранга 1 и не порождается одним элементом. Положим

$$\Delta = \{2D_{11}, 2D_{12}, 2D_{22}\}, \quad \text{где } D_{11} = x^2D, \quad D_{12} = xyD, \quad D_{22} = y^2D.$$

Аналогично предыдущему построим $(-1, 1)$ -супералгебру $B(A, \Delta, \Upsilon)$. Тогда йорданова супералгебра $B(A, \Delta, \Upsilon)^{(+)_s}$ совпадает с супералгеброй $J(A, \Delta')$, где $\Delta' = \{D_{ij} \mid i, j = 1, 2\}$, построенной в [8]. Поскольку $J(A, \Delta')$ — простая супералгебра (см. [8]), $B(A, \Delta, \Upsilon)$ — простая супералгебра.

ВОПРОС. Существует ли простая $(-1, 1)$ -супералгебра $B(A, \Delta, \Upsilon)$, у которой нечетная часть как модуль над четной частью порождается больше чем двумя элементами?

§ 3. Некоторые свойства универсальных обертывающих простых йордановых супералгебр $J(A, \Delta)$

В этом параграфе изучим некоторые свойства универсальных обертывающих простых йордановых супералгебр $J(A, \Delta)$, где $\Delta = \{D_{ij} \mid i, j = 1, \dots, n\}$ — множество дифференцирований алгебры A .

Пусть $\alpha \in A$ такой, что $D_{11}(\alpha) \neq 0$, в алгебре $A[D_{11}(\alpha)^{-1}]$ рассмотрим элементы $\alpha_i = D_{11}(\alpha)^{-1}D_{i1}(\alpha)$, $i = 1, \dots, n$, и A -алгебру Γ , порожденную $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

Пусть $\text{End } \Gamma$ — алгебра линейных преобразований векторного пространства Γ и $M_{1,1}(\text{End } \Gamma)$ — ассоциативная супералгебра с четной частью

$$\left\{ \begin{pmatrix} \psi_1 & 0 \\ 0 & \psi_2 \end{pmatrix} \mid \psi_1, \psi_2 \in \text{End } \Gamma \right\}$$

и нечетной частью

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & \psi_1 \\ \psi_2 & 0 \end{pmatrix} \mid \psi_1, \psi_2 \in \text{End } \Gamma \right\}.$$

Как известно (см. [11]), отображение $\phi : J(A, \Delta) \mapsto M_{1,1}(\text{End } \Gamma)$, заданное на четных элементах

$$\phi : a \mapsto \begin{pmatrix} R_a & 0 \\ 0 & R_a \end{pmatrix},$$

а на нечетных элементах

$$\phi : \sum_i b_i x_i \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 4 \sum_i R_{b_i} D_{i1} + 2 \sum_i R_{D_{i1}(b_i)} + 2 \sum_i R_{b_i \gamma_{i1}} \\ - \sum_i R_{b_i \alpha_i} & 0 \end{pmatrix},$$

является ассоциативной специализацией супералгебры $J(A, \Delta)$ в супералгебру $M_{1,1}(\text{End } \Gamma)$. Как показано в § 1, $J(A, \Delta)$ является подсупералгеброй в $B^{(+)}_s$ для некоторой $(-1, 1)$ -супералгебры B . Этот факт дает еще одно доказательство специальности $J(A, \Delta)$.

Пусть $J(\Gamma, D)$ — простая йорданова супералгебра векторного типа и $W = \Gamma[t]$ — векторное пространство полиномов от переменной t с коэффициентами из Γ . Определим на W структуру дифференциальной алгебры, полагая $t \cdot a = at + D(a)$. Тогда отображение $m : J(\Gamma, D) \mapsto M_{1,1}(W)$, заданное правилом

$$m : a \mapsto \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}, \quad a \in \Gamma, \quad m : \xi \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 2t \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

является ассоциативной специализацией супералгебры $J(\Gamma, D)$. Как показано в [15], супералгебра $M_{1,1}(W)$ является ассоциативной обертывающей супералгебры $J(\Gamma, D)$.

Пусть $J = J(A, \Delta) = A + M$, $M = Ax_1 + \dots + Ax_n$ и U — универсальная обертывающая йордановой супералгебры J . Можно считать, что J — подсупералгебра в $U^{(+)}_s$. Умножение в алгебре U будем обозначать через $(*)$.

Предложение 6. Пусть йорданова супералгебра J проста и $\Delta = \{D_{ij} \mid i, j = 1, \dots, n\}$. Тогда

$$A = \sum_{ij} D_{ij}(A) + \sum_{ij} \sum_{kl} D_{ij}(A) D_{kl}(A).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если $n = 1$, то все доказано в силу леммы 3.1 из [15].

Пусть $n > 1$. Тогда $D_{ij} D_{lk} \neq 0$ в силу предложения 9 из [6]. Поэтому $\sum_{ijkl} AD_{ij} D_{lk}(A)$ — ненулевой идеал в A , инвариантный относительно Δ . Следовательно,

$$A = \sum_{ijkl} AD_{ij} D_{lk}(A) \subseteq \sum_{ijkl} D_{ij}(AD_{lk}(A)) + \sum_{ijkl} D_{ij}(A) D_{lk}(A).$$

Предложение 7. Для любых $a, b \in A$ коммутатор $[a, b] = a * b - b * a$ лежит в центре U .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку в супералгебре J ассоциатор $(a, x, b) = 0$ для любого $x \in J$ и $4(a, x, b) = [x, [a, b]]$, где $[x, [a, b]]$ — коммутатор в U , то $[x, [a, b]] = 0$. Так как алгебра U порождается J , то $[a, b]$ лежит в центре U .

Идея доказательства следующего предложения аналогична доказательству леммы 3.3 из [15].

Предложение 8. Пусть J — простая йорданова супералгебра. Тогда для любых $a, b \in A$ коммутатор $[a, b]$ равен 0 в алгебре U .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В J имеет место $D_{ij}(a) = (a, x_i, x_j)$ для любого $a \in A$. Так как

$$(a, x_i, x_j) + (x_i, x_j, a) - (x_j, a, x_i) = 0, \quad (x_i, x_j, a) = (a, x_i, x_j),$$

то $2D_{ij}(a) = (x_j, a, x_i) = \frac{1}{4}[x_i \circ x_j, a]$, где $x_i \circ x_j = x_i * x_j + x_j * x_i$.

Пусть векторное пространство S линейно порождается $[[x_i \circ x_j, a], b]$, где $a, b \in A$. В силу предложения 7 S линейно порождается $[[x_i \circ x_j, a], a]$. Ясно, что $S \subseteq [A, A]$, тем самым S лежит в центре U . Для любого $c \in A$

$$\begin{aligned} 2[[x_i \circ x_j, a], a] * c &= [[x_i \circ x_j, a], a] \circ c = [[x_i \circ x_j, a], a \circ c] - [[x_i \circ x_j, a], c] \circ a \\ &= [[x_i \circ x_j, a], a \circ c] - [[x_i \circ x_j, c], a] \circ a = [[x_i \circ x_j, a], a \circ c] - [[x_i \circ x_j, c], a^2] \in S. \end{aligned}$$

Поэтому $S * A \in S$.

Покажем, что $S * D_{ij}(a) = 0$ для любого $a \in A$. Пусть $s \in S$. Тогда

$$2s * [x_i \circ x_j, a] = s \circ [x_i \circ x_j, a] = [x_i \circ x_j, s \circ a] - [x_i \circ x_j, s] \circ a = 0.$$

Следовательно, $S * D_{ij}(a) = 0$ для любого $a \in A$.

Так как J проста, по предложению 6

$$S = S * 1 \subseteq S * \sum_{ij} D_{ij}(A) + S * \left(\sum_{ij} \sum_{kl} D_{ij}(A) \circ D_{kl}(A) \right) = 0.$$

Поэтому $[D_{ij}(A), A] = 0$. Тогда по предложению 6

$$\begin{aligned} [A, A] &\subseteq \sum_{ij} [D_{ij}(A), A] + \sum_{ij} \sum_{kl} [D_{ij}(A) D_{kl}(A), A] = \sum_{ij} \sum_{kl} [D_{ij}(A) \circ D_{kl}(A), A] \\ &\subseteq \sum_{ij} [D_{ij}(A), A] \circ D_{kl}(A) + \sum_{ij} \sum_{kl} D_{ij}(A) \circ [D_{kl}(A), A] = 0. \end{aligned}$$

В силу предложения 7 из [6] выполнено

Предложение 9. Пусть J — простая йорданова супералгебра. Тогда для любых $a, b \in A$ и $x, y \in M$ в алгебре U справедливо $[a, x] * [b, y] = 0$.

Предложение 10. Пусть J — простая йорданова супералгебра. Тогда четная часть U_0 супералгебры U линейно порождается элементами вида

$$a * x_1^{k_1} * \dots * x_n^{k_n}, \quad a * x_1^{l_1} * \dots * x_n^{l_n} * [b, x_i],$$

где $a, b \in A$, $k_1 + \dots + k_n = 2p$, $l_1 + \dots + l_n = 2q - 1$, а нечетная часть U_1 —

$$a * x_1^{k_1} * \dots * x_n^{k_n}, \quad a * x_1^{l_1} * \dots * x_n^{l_n} * [b, x_i],$$

где $a, b \in A$, $k_1 + \dots + k_n = 2p - 1$, $l_1 + \dots + l_n = 2q$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для $u = x_{i_1} * \dots * x_{i_m}$, где $i_1 \leq \dots \leq i_m$, через V обозначим множество элементов, состоящих из произведения (возможно, пустого) $x_{i_{j_1}}, x_{i_{j_2}}, \dots, x_{i_{j_r}}$, входящих в u , причем $i_{j_1} \leq i_{j_2} \leq \dots \leq i_{j_r}$.

Пусть $u = x_{i_1} * \dots * x_{i_{2k}}$, где $i_1 \leq \dots \leq i_{2k}$. Покажем, что $u * a = \sum_{v \in V} a_v * v$ для элемента $a \in A$, где все $a_v \in A$. В силу предложения 8

$$\begin{aligned} x_i * x_j * a &= a * x_i * x_j + [x_i * x_j, a] = a * x_i * x_j + \frac{1}{2}[x_i \circ x_j + [x_i, x_j], a] \\ &= a * x_i * x_j + \frac{1}{2}[x_i \circ x_j, a]. \end{aligned}$$

Так как $[x_i \circ x_j, a] = 8D_{ij}(a) \in A$, при $k = 1$ все доказано. Поскольку

$$u * a = x_{i_1} * \dots * x_{2(k-1)} * a * x_{2k-1} * x_{i_{2k}} + x_{i_1} * \dots * x_{2(k-1)} * [x_{2k-1} * x_{i_{2k}}, a]$$

и $[x_{2k-1} * x_{i_{2k}}, a] \in A$, несложной индукцией получаем искомый результат.

Пусть $u = x_{i_1} * \dots * x_{i_{2k+1}}$, где $i_1 \leq \dots \leq i_{2k+1}$. Тогда

$$u * a = \sum_{v \in V} a_v * v + x_{i_1} * \dots * x_{i_{2k}} * [x_{i_{2k+1}}, a].$$

Так как

$$u * a = x_{i_1} * \dots * x_{i_{2k}} * a * x_{i_{2k+1}} + x_{i_1} * \dots * x_{i_{2k}} * [x_{i_{2k+1}}, a],$$

по доказанному выше получаем искомый результат.

Пусть $u = x_{i_1} * \dots * x_{i_k}$, где $i_1 \leq \dots \leq i_k$. Покажем, что $u * x_r = \sum_i a * u_i + \sum_i b_i * w_i * [c_i, x_{r_i}]$, где каждый u_i имеет вид $x_{j_1} * \dots * x_{j_l}$, $j_1 \leq \dots \leq j_l \leq \max(i_k, x_r)$, каждый w_j имеет вид $x_{j_1} * \dots * x_{j_l}$, $j_1 \leq \dots \leq j_l \leq r_j \leq i_k$, $a_i, b_i, c_i \in A$ и $\{j_1, \dots, j_l, r_i\} \subseteq \{i_1, \dots, i_k, r\}$.

Если $i_k \leq r$, то все доказано. Поэтому можно считать, что $i_k > r$. В этом случае

$$u * x_r = x_{i_1} * \dots * x_{i_{k-1}} * x_r * x_{i_k} + x_{i_1} * \dots * x_{i_{k-1}} * [x_{i_k}, x_r].$$

Заметим, что $[x_{i_k}, x_r] = 2\gamma_{i_k r} \in A$. Если $k = 1$, то все доказано.

Пусть $k > 1$. Если $i_{k-1} \leq r$, то все доказано. Пусть $r < i_{k-1}$. Тогда по предположению индукции можно считать, что

$$x_{i_1} * \dots * x_{i_{k-1}} * x_r = \sum_i a * u_i + \sum_i b_i * w_i * [c_i, x_{r_i}]$$

и все u_i, w_i имеют указанный вид. Поэтому

$$u * x_r = \sum_i a_i * u_i * x_{i_k} + \sum_i b_i * w_i * [c_i, x_{r_i}] * x_{i_k},$$

где $u_i * x_{i_k}$ имеет указанный выше вид. Поскольку

$$\begin{aligned} [c_i, x_{r_i}] * x_{i_k} &= -x_{r_i} * [c_i, x_{i_k}] + [c_i, x_{r_i} * x_{i_k}] \\ &= -x_{r_i} * [c_i, x_{i_k}] + \frac{1}{2}[c_i, x_{r_i} \circ x_{i_k} + [x_{r_i}, x_{i_k}]] = -x_{r_i} * [c_i, x_{i_k}] + \frac{1}{2}[c_i, x_{r_i} \circ x_{i_k}] \end{aligned}$$

и $[c_i, x_{r_i} \circ x_{i_k}] \in A$, то $w_i * [c_i, x_{r_i}] * x_{i_k}$ имеет указанный вид.

Отсюда следуют все утверждения данного предложения.

Предложение 11. Пусть йорданова супералгебра J проста. Тогда в алгебре U существуют ортогональные идемпотенты e_1, e_2 такие, что $e_1 + e_2 = 1$, $[e_i, U_0] = 0$, $i = 1, 2$, $M \subseteq e_1 * U_1 * e_2 + e_2 * U_1 * e_1$, $[A, M] \subseteq e_1 * [A, M] * e_2$. Пусть

$$V = \text{span}\{a_i * x_1^{k_{1i}} * \dots * x_n^{k_{ni}} \mid k_{1i} + \dots + k_{ni} = 2r_i\}.$$

Тогда $U_0 = V * e_1 + V * e_2$, $U_1 = U_0 * x_1 + \dots + U_0 * x_n + U_0 * [d_1, x_1] + \dots + U_0 * [d_n, x_n]$, $d_1, \dots, d_n \in A$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как супералгебра J проста, алгебра A дифференциально проста относительно множества дифференцирований Δ . Поэтому $1 = \sum_{ijk} b_k D_{ij}(c_k)$. Следовательно, $1 = \sum_i D_{x_i, z_i}(a_i) = \sum_i (a_i, x_i, z_i)$, где $a_i \in A$, $z_i \in M$ для всех i . Тогда в алгебре U имеем $1 = \frac{1}{2} \sum_i [a_i, y_i] \circ x_i$, где $y_i \in M$ для всех i .

Рассмотрим $s = \frac{1}{2} \sum_i [a_i, y_i], x_i]$. В силу предложения 12 из [6] $s^2 = 1$, $[[A, M], M] \circ M \subseteq [A, M]$, $[[A, M], M] \circ [A, M] = 0$, $[A, s] = 0$ и $[[A, M], M] = A \circ s$. Отсюда для $m \in M$ получаем

$$2s * m * s = (m \circ s) \circ s - m \circ s^2 = -2m.$$

Следовательно, $m \circ s = 0$.

Пусть $e_1 = \frac{1}{2}(1 + s)$, $e_2 = \frac{1}{2}(1 - s)$. Тогда $e_1 = \frac{1}{2} \sum_i [a_i, y_i] * x_i$, $e_2 = \frac{1}{2} \sum_i x_i * [a_i, y_i]$ и $[A, e_i] = 0$. Так как $s \circ m = 0$ для любого $m \in M$, то $e_i \circ m = m$. Поэтому

$$\begin{aligned} [x_i * x_j, e_1] &= \frac{1}{2} [x_i \circ x_j + [x_i, x_j], e_1] = \frac{1}{2} [x_i \circ x_j, e_1] \\ &= -\frac{1}{2} [x_j \circ e_1, x_i] - \frac{1}{2} [e_1 \circ x_i, x_j] = -\frac{1}{2} [x_j, x_i] - \frac{1}{2} [x_i, x_j] = 0. \end{aligned}$$

Отсюда легко получить, что $[e_1, U_0] = 0$.

Рассмотрим $u = a * x_1^{k_1} * \dots * x_n^{k_n} * [b, x_i] \in U_0$. Будем считать, что $k_n > 0$. Тогда

$$u = a * x_1^{k_1} * \dots * x_n^{k_n-1} * \left(\frac{1}{2} x_{k_n} \circ [b, x_i] - \frac{1}{2} [x_{k_n}, [b, x_i]] \right).$$

Так как $x_{k_n} \circ [b, x_i] \in A$ и $[x_{k_n}, [b, x_i]] \in A \circ s$, имеем

$$u = \sum_i a_i * x_1^{k_{1i}} * \dots * x_n^{k_{ni}} + \sum_i b_i * x_1^{l_{1i}} * \dots * x_n^{l_{ni}} * s,$$

где $k_{1i} + \dots + k_{ni} = 2r_i$, $l_{1i} + \dots + l_{ni} = 2l_i$. Следовательно, $U_0 = V * e_1 + V * e_2$. Ясно, что $M \subseteq e_1 * U_1 * e_2 + e_2 * U_1 * e_1$. В силу предложения 9 $[A, M] \subseteq e_1 * [A, M] * e_2$.

Пусть $f(x, y) = x^2 + y^4 - 1$ и $\Lambda = F[x, y]/f(x, y)F[x, y]$. Тогда $\Lambda = A + M$ — Z_2 -градуированная алгебра. Рассмотрим множество дифференцирований

$$\Delta = \{D_{11}, D_{12}, D_{22}\},$$

где

$$D_{11} = x^2 D, \quad D_{12} = xy D, \quad D_{22} = y^2 D, \quad D = 2y^3 \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}.$$

Тогда $J(A, \Delta)$ — простая йорданова супералгебра. Пусть U — универсальная ассоциативная обертывающая супералгебры $J(A, \Delta)$.

Пусть $W = \Lambda[t]$ — дифференциальная алгебра относительно дифференцирования D . Тогда W допускает Z_2 -градуировку, $W_0 = A[t]$, $W_1 = M[t]$. В алгебре $M_2(W)$ рассмотрим Z_2 -градуированную подалгебру E с градуировкой

$$E_0 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in W_0 \right\}, \quad E_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & v \\ w & 0 \end{pmatrix} \mid v, w \in W_1 \right\}.$$

Тогда $m : J(A, \Delta) \mapsto E$, заданное правилом

$$m(a) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}, \quad a \in A,$$

$$m(x) = \begin{pmatrix} 0 & 4xt + 4y^3 \\ -x & 0 \end{pmatrix}, \quad m(y) = y \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 4yt - 2x \\ -y & 0 \end{pmatrix},$$

является ассоциативной специализацией супералгебры $J(A, \Delta)$. Следовательно, существует гомоморфизм супералгебр $u : U \mapsto E$ такой, что $(ui)(z) = m(z)$, где $z \in J(A, \Delta)$ и i — вложение $J(A, \Delta)$ в $U^{(+)*}$. Нетрудно показать, что u — эпиморфизм и для идемпотентов e_1, e_2 из предложения 11

$$u(e_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad u(e_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вопрос. Является ли u изоморфизмом?

ЛИТЕРАТУРА

1. Кантор И. Л. Йордановы и лиевы супералгебры, определяемые алгеброй Пуассона // Алгебра и анализ. Вторая сибирская школа. Томск, 1989. С. 55–80.
2. King D., McCrimmon K. The Kantor construction of Jordan superalgebras // Commun. Algebra. 1992. V. 20, N 1. P. 109–126.
3. King D., McCrimmon K. The Kantor doubling process revisited // Commun. Algebra. 1995. V. 23, N 1. P. 357–372.
4. Шестаков И. П. Простые супералгебры типа $(-1, 1)$ // Алгебра и логика. 1998. Т. 37, № 6. С. 721–739.
5. Желябин В. Н. Простые специальные йордановы супералгебры с ассоциативной ниль-полупростой четной частью // Алгебра и логика. 2002. Т. 41, № 3. С. 276–310.
6. Желябин В. Н., Шестаков И. П. Простые специальные супералгебры с ассоциативной четной частью // Сиб. мат. журн. 2004. Т. 45, № 5. С. 1046–1072.
7. Желябин В. Н. Дифференциальные алгебры и простые йордановы супералгебры // Мат. тр. 2009. Т. 12, № 2. С. 41–51.
8. Желябин В. Н. Новые примеры простых йордановых супералгебр над произвольным полем характеристики нуль // Алгебра и анализ. 2012. Т. 24, № 4. С. 84–96.
9. Cantarini N., Kac V. G. Classification of linearly compact simple Jordan and generalized Poisson superalgebras // J. Algebra. 2007. V. 313, N 2. P. 100–124.
10. Желябин В. Н. Примеры первичных йордановых супералгебр векторного типа и супералгебр типа Ченга — Каца // Сиб. мат. журн. 2013. Т. 54, № 1. С. 49–56.
11. Желябин В. Н. Йордановы супералгебры векторного типа и проективные модули // Сиб. мат. журн. 2012. Т. 53, № 3. С. 566–579.
12. Шестаков И. П. Супералгебры и контрпримеры // Сиб. мат. журн. 1991. Т. 32, № 6. С. 187–196.
13. McCrimmon K. Speciality and non-speciality of two Jordan superalgebras // J. Algebra. 1992. V. 149, N 2. P. 326–351.
14. Swan R. G. Vector bundles and projective modules // Trans. Amer. Math. Soc. 1962. V. 105. P. 264–277.

15. Martinez C., Zelmanov E. Specializations of Jordan superalgebras Dedicated to Robert V. Moody // Can. Math. Bull. 2002. V. 45, N 4. P. 653–671.

Статья поступила 16 сентября 2014 г.

Желябин Виктор Николаевич
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН,
пр. Академика Коптюга, 4, Новосибирск 630090;
Новосибирский гос. университет,
ул. Пирогова, 2, Новосибирск 630090
`vicnic@math.nsc.ru`